




## Écozone du bouclier boréal

L'écozone du bouclier boréal s'étend, en forme de " U ", du nord de la Saskatchewan à Terre-Neuve en passant au nord du lac Winnipeg, des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.

Les conditions climatiques varient légèrement d'une extrémité de l'écozone à l'autre. Le bouclier boréal subit, dans une large mesure, l'influence des masses d'air froid de la baie d'Hudson, auxquelles il doit également ses précipitations relativement abondantes, soit de 400 mm dans la partie occidentale à 1000 mm dans la partie orientale. La température quotidienne moyenne est de  $-10^{\circ}\text{C}$  à  $-20^{\circ}\text{C}$  en janvier et de  $15^{\circ}\text{C}$  à  $18^{\circ}\text{C}$  en juillet.



Les mammifères caractéristiques de l'écozone du bouclier boréal sont le caribou des bois, le cerf de Virginie, l'orignal, l'ours noir, le raton laveur, la martre, le pékan, la mouffette rayée, le lynx du Canada, le lynx roux et le tamia rayé.

Les oiseaux particuliers à la région comprennent la nyctale boréale, le grand-duc d'Amérique, le geai bleu et le gros-bec errant.

Parmi les mammifères marins, on retrouve le phoque à capuchon, le phoque gris et le phoque du Groenland, la baleine à bec commune, le cachalot, l'épaulard, le globicéphale noir de l'Atlantique, le rorqual commun et le rorqual bleu.

Cette écozone inclut :

- [La réserve de parc national du Canada de l'Archipel-de-Mingan](#)
- [Le parc national du Canada Gros-Morne](#)
- [Le parc national du Canada des Îles-de-la-Baie-Georgienne](#)
- [Le parc national du Canada de la Mauricie](#)
- [Le parc national du Canada Pukaskwa](#)
- [Le parc national du Canada Terra Nova](#)

Référence : Direction des terres, *Les écozones terrestres du Canada*, Classification écologique des terres, série no 19, Environnement Canada, 1986, 26 p.

Automne 2003